

IVERPLUS 1 %

Solución Inyectable



Composición

Ivermectina 1000 mg

Indicaciones

Tratamiento y control de infestaciones por los siguientes parásitos: **BOVINOS:** VERMES REDONOS G.I.: *Ostertagia ostertagi* (adultos, L4 y formas inhibidas), *O. Lirata* (adultos y L4), *Haemonchus place* (adultos y L4), *Trichostrongylus axei* (adultos y L4), *T. Combriformis* (adultos y L4), *Cooperia oncophora* (adultos y L4), *C. punctata* (adultos y L4), *C. pockinatus* (adultos y L4), *Oesophagostomun radiatum* (adultos y L4), *Nematodirus helvetianus* (adultos), *N. Spathiger* (adultos), *Bunostomun phlebotomun* (adultos). VERMES PULMONARES: *Dictyocaulus viviparus* (adultos y L4), Barros (los tres estadios pulmonares), *Hipoderma bovis*, *H. lineatum*. PIOJOS: *Linognatus vituli*, *Haemonchus eurytenuis*, *Solenopotes capillatus*. ACAROS: *Sarcoptes scabiei*, *Psoroptes ovis* (var. Boris). **OVINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS:** VERMES REDONDOS G.I. (adultos e inmaduros): *Haemonchus contortus*, *Ostertagia circumcincta*, *O. trijucata*, *Trichostrongylus axei* (adultos), *T. vitrinus* (adultos), *T. culobriiformis*, *Nematodirus filicollis*, *Cooperia curticei*, *Oesophagostomun columbianum*, *O. venulosum*, *Chabertia ovina*, *Trichuris ovis* (adultos). VERMES PULMONARES: (adultos e inmaduros): *Dictyocaulus filaria*, *Protostongylus rufescens*. REZNOS NASALES (ESTROS): *Oestrus ovis* (todos los estados larvarios) ACAROS: *Sarcoptes scabiei* entre otros.

Dosis

Administración parenteral, por vía subcutánea o intramuscular. **BOVINOS:** se recomienda administrar 1 mL por cada 50 kilos de peso, lo que equivale a 300mcg por kilo de peso corporal. **OVINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS:** se recomienda administrar 1 mL por cada 50 kilos de peso, lo que equivale a 300mcg por kilo de peso corporal. **PORCINOS:** Se recomienda administrar 1 mL por cada 33 kilos de peso, lo que equivale a 450 mcg por kilo de peso corporal. **CANES:** Se recomienda 0.1mL por cada 5 kilos de peso lo que equivale a 300 mcg por kilo de peso corporal. **PERÍODO DE RETIRO: CARNES DE VACUNOS:** 42 días antes del sacrificio del animal. **CARNES DE PORCINOS:** 42 días antes del sacrificio del animal. **CARNES DE OVINOS:** 42 días antes del sacrificio. **LECHE:** 42 días antes del consumo humano. **EFFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES:** La Ivermectina tiene un amplio margen de seguridad (10 veces la dosis recomendada), por lo que la toxicidad y los efectos secundarios son muy poco probables. En caso de intoxicación se puede producir temblores, convulsiones y coma. En estos casos administre tratamiento sintomático. Es seguro para administrarlo en vacas en gestación.

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Países

Labodec

