

IVERPLUS LA 1.5 %

Solución Inyectable



Composición

Ivermectina 1300 mg

Indicaciones

Tratamiento y control de infestaciones por los siguientes parásitos: BOVINOS: VERMES REDONOS G.I.: Ostertagia ostertagi (adultos, L4 y formas inhibidas), O. Lirata (adultos y L4), Haemonchus place (adultos y L4), Trichostrongylus axei (adultos y L4), T. Combriformis (adultos y L4), Cooperia oncophora (adultos y L4), C. punctata (adultos y L4), C. pockinatus (adultos y L4), Oesophagostomun radiatum (adultos y L4), Nematodirus helvetianus (adultos), N. Spathiger (adultos), Bunostomun phlebotomun (adultos). VERMES PULMONARES: Dictyocaulus viviparus (adultos y L4), Barros (los tres estadios pulmonares), Hipoderma bovis, H. lineatum. PIOJOS: Linognathus vituli, Haemonchus eurysternus, Solenopotes capillatus. ACAROS: Sarcoptes scabiei, Psoroptes ovis (var. Boris). OVINOS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS: VERMES REDONDOS G.I. (adultos e inmaduros): Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta, O. trijucata, Trichostrongylus axei (adultos), T. vitrinus (adultos), T. culobriiformis, Nematodirus filicollis, Cooperia curticei, Oesophagostomun columbianum, O. venulosum, Chabertia ovina, Trichuris ovis (adultos). VERMES PULMONARES: (adultos e inmaduros): Dictyocaulus filaria, Protostongylus rufescens. REZNOS NASALES (ESTROS): Oestrus ovis (todos los estados larvarios) ACAROS: Sarcoptes scabiei entre otros.

Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL/75 Kg de p.v. ; subcutánea. Porcinos: 1 mL/50 Kg de p.v. ; vía subcutánea. PERIODO DE RETIRO: Bovinos: 35 días. Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 28 días. Porcinos: 18 días. EFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES: La Ivermectina tiene un amplio margen de seguridad (10 veces la dosis recomendada), por lo que la toxicidad y los efectos secundarios son muy poco probables. En caso de intoxicación se puede producir temblores, convulsiones y coma. En estos casos administre tratamiento sintomático. Es seguro para administrarlo en vacas en gestación.

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Subcutáneo

Países

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Pulmonares – traqueales
Antiparasitarios De Uso Externo

Labodec

