CHLORVET®

Montana

Premix

Composición

Clortetraciclina, clorhidrato 20 g

Indicaciones

Indicado para el control y tratamiento de enfermedades causadas por bacterias Gram positivo, Gram negativo y Mycoplasma spp. Su presentación granulada permite lograr un mejor mezclado con el alimento y una menor merma. El complejo cálcico facilita una mayor y rápida absorción del producto. Se distribuye fácilmente en los tejidos blanco. Tiene un alto margen de seguridad en el tratamiento de las principales infecciones bacterianas.

Dosis

Para administración vía alimento balanceado a razón de: Aves: • Edad: De 1 – 21 días: La dosis es de 1 a 2 kg de Chlorvet / T de alimento durante 7 – 14 días o según el criterio del médico veterinario. • Edad: De 21 días en adelante: La dosis es de 2 a 3 kg de Chlorvet / T de alimento durante 7 – 14 días o según el criterio del médico veterinario. Porcinos: • Mejorador de la producción: 1 kg de Chlorvet/T de alimento. • Tratamiento: De 1.5 a 2 kg de Chlorvet/ T de alimento durante 7 – 14 días o según criterio del médico veterinario. • Abortos por Leptospira spp: De 2.5 kg de Chlorvet/T de alimento durante 7 – 14 días o según criterio del médico veterinario. Periodo de retiro: 7 días.

Presentaciones

Bolsa 1 kg, Bolsa 25 kg,

Vias Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.03.20.N.1459

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01A TETRACICLINAS
QJ01AA Tetraciclinas
QJ01AA03 clortetraciclina

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Tetracilinas

Web Site

http://www.corpmontana.com/porcicultura_detalle.php?sP=357

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com