CYCLUS® POUR ON

Montana

Solución Tópica Pour On



Composición

Fluazuron 2.5 g
Flumetrina 1 g



Indicaciones

Para el tratamiento y control de parásitos externos como: Garrapatas: Boophilus microplus (garrapata común del bovino), Boophilus annulatus, Amblyomma cajennense, Amblyomma imitator, Amblyomma maculatum, Dermacentor albipictus, Dermacentor occidentalis, Dermacentor dissimilis, Haemaphysalis spp., Ixodes spp., Otobius megnini. Piojos chupadores: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenoptes capillatus. Piojos masticadores: Damalinea bovis. Ácaro de la sarna: Psoroptes bovis. Moscas: Haematobia irritans (mosca de los cuernos), Cochlyomia spp., Melophagus ovinus (falsa garrapata), Callitroga hominivorax, Dermatobia hominis.

Dosis

Vía de administración tópica para aplicación Pour On, en el dorso de los animales desde la cruz hasta la base de la cola a una dosis de 1 mg/kg de peso vivo de flumetrina y 2.5 mg/kg de peso vivo de fluazurón o su equivalente a un volumen total de 1 ml/10 kg de peso vivo. Se sugiere repetir el tratamiento cada 12 semanas o de acuerdo a la recomendación del médico veterinario, el tratamiento puede variar dependiendo la severidad de la infestación, las características ambientales o las condiciones de manejo.

Presentaciones

Caja 24 unidad (es), Caja 12 unidad (es), Frasco 1 L, Frasco 30 mL, Frasco 500 mL, Frasco 20 mL,

Vias Administración

Topical Dérmico

Paises

Perú SENASA F.07.33.N.0457

Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP53 ECTOPARASITICIDAS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP53A ECTOPARASITICDAS PARA USO TOPICAL, INCL. INSECTICIDAS
QP53AC Piretrinas y piretroides
QP53AC55 flumetrina, combinaciones

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios De Uso Externo
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)
Garrapatas
Piojos
Insecticidas Y Antifungicos
Insecticidas

Web Site

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com