

PROSANTEL® SE

Suspensión Oral



Composición

Closantel 12 g
Selenio 5 mg

Indicaciones

Para el tratamiento y control de parásitos internos y externos, su acción va dirigida contra Tremátodos (estadios inmaduros y adultos): Fasciola hepatica. Nemátodos Gastrointestinales: Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Haemonchus spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Chabertia ovina, Capillaria spp., Strongyloides papillosus, Strongyloides ransomi, Nematodirus spp., Toxocara vitulorum, Trichostrongylus spp., Hyostrongylus rubidus, Protostrongylus rufescens, Trichuris ovis, Mecistocirrus digitatus, Thelazia spp., Nematodirus lamae, Lamanema chavezii, Graphinema spp., Spiculoptera spp., Camelostomum spp. Larvas de moscas: Oestrus ovis (miasis cavitaria o gusano de la nariz), Dermatobia hominis (nuche o tupe), Hypoderma spp., Cochliomyia hominivorax (gusanera o miasis cutánea). Acaros de la sarna: Psoroptes bovis, Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei var. bovis, var. aucheniae, var. ovis, Chorioptes bovis, Demodex spp., entre otros.

Dosis

Vía oral. Para casos de parasitosis interna (Fasciola hepatica y nematodos gastrointestinales) un volumen de 1 ml/10 kg de peso vivo. Contra parásitos externos (Oestrus ovis, ácaros de la sarna, larvas de moscas y garrapatas) un volumen de 1.5 ml/10 kg de peso vivo; para el control de la sarna repetir la dosis a los 7 - 10 días.

Presentaciones

Frasco 1 L, Frasco 500 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.08.02.N.0532

Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP52 ANTHELMINTICOS
QP52A ANTIHELMINTICOS
QP52AG Derivados del fenol, incl. salicilanilidas
QP52AG09 closantel

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Hepáticos (trematodos-fasciola)
Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)

Montana

MONTANA

