

SANIBENDAZOL® 10%

Emulsión Oral



Composición

Albendazol 10 g

Indicaciones

Para el control y tratamiento de la fasciolosis o distomatosis en estadios inmaduros y adultos, nemátodos gastrointestinales, nemátodos pulmonares (gusanos redondos) y tenias (gusanos planos) del bovino, ovino, caprinos y camélidos sudamericanos.

Dosis

Vía oral a una dosis de 10 - 20 mg/kg de peso vivo, la misma que varía de acuerdo al tipo de parásito a eliminar. Para casos de fasciola hepática: 20 mg/kg o su equivalente a un volumen total de aplicación de 1 ml/5 kg de peso vivo. Contra nemátodos gastrointestinales, pulmonares y tenias: 10 mg/kg o su equivalente a un volumen total de 1 ml/10 kg de peso vivo.

Presentaciones

Galonera 3.5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 200 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.08.02.N.158

Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP52 ANTHELMINTICOS
QP52A ANTIHELMINTICOS
QP52AC Benzimidazoles y sustancias relacionadas
QP52AC11 albendazol

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Hepáticos (trematodos-fasciola)
Pulmonares – traqueales
Tenias (cestodos)

Web Site

http://www.corpmontana.com/ganaderia_detalle.php?sP=216

Montana

MONTANA

