

SANITRAZ®

Solución Tópica



Composición

Amitraz 12.5 g

Indicaciones

Para el tratamiento y control de parásitos externos como:
Garrapatas: *Boophilus microplus* (garrapata común del bovino), *Boophilus annulatus*, *Amblyomma cajennense*, *Amblyomma imitator*, *Amblyomma maculatum*, *Dermacentor albipictus*, *Dermacentor occidentalis*, *Dermacentor dissimilis*, *Haemaphysalis* spp., *Ixodes* spp., *Otobius megnini*. Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenoptes capillatus*. Piojos masticadores: *Damalinea bovis*. Ácaros de la sarna: *Psoroptes bovis*, *Psoroptes ovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, var. *aucheniae*, var. *ovis*, *Chorioptes bovis*, *Demodex* spp., *Psoroptes aucheniae* ("caracha", "uma usa"). Asimismo, pueden ser usados para la desinfección de instalaciones.

Dosis

Uso externo mediante baños de aspersión. Dosis contra garrapatas en vacunos: Diluir 1.65 ml por cada 1 litro de agua. Usar por lo menos 4 litros de la solución para un animal de aproximadamente 300 kg. Mezclar 1 frasco de Sanitraz de 33ml en la mochila aspersora de 20 litros de agua, cantidad necesaria para bañar 5 animales de 300 kg. Baños cada 21 días para el control de *Boophilus microplus*.

Presentaciones

Frasco 1 L, Frasco 250 mL, Frasco 33 mL,

Vías Administración

Topical Dérmico

Países

Perú SENASA F.07.08.N.078

Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP53 ECTOPARASITICIDAS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP53A ECTOPARASITICIDAS PARA USO TOPICAL, INCL. INSECTICIDAS
QP53AD Amidinas
QP53AD01 amitraz

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Garrapatas
Piojos

Web Site

http://www.corpmontana.com/ganaderia_detalle.php?sP=226

Montana

MONTANA

