

## SANITRAZ®

Solución Tópica



### Composición

Amitraz 12.5 g

### Indicaciones

Para el tratamiento y control de parásitos externos como:  
Garrapatas: *Boophilus microplus* (garrapata común del bovino), *Boophilus annulatus*, *Amblyomma cajennense*, *Amblyomma imitator*, *Amblyomma maculatum*, *Dermacentor albipictus*, *Dermacentor occidentalis*, *Dermacentor dissimilis*, *Haemaphysalis* spp., *Ixodes* spp., *Otobius megnini*. Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenoptes capillatus*. Piojos masticadores: *Damalinea bovis*. Ácaros de la sarna: *Psoroptes bovis*, *Psoroptes ovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, var. *aucheniae*, var. *ovis*, *Chorioptes bovis*, *Demodex* spp., *Psoroptes aucheniae* ("caracha", "uma usa"). Asimismo, pueden ser usados para la desinfección de instalaciones.

### Dosis

Uso externo mediante baños de aspersión. Dosis contra garrapatas en vacunos: Diluir 1.65 ml por cada 1 litro de agua. Usar por lo menos 4 litros de la solución para un animal de aproximadamente 300 kg. Mezclar 1 frasco de Sanitraz de 33ml en la mochila aspersora de 20 litros de agua, cantidad necesaria para bañar 5 animales de 300 kg. Baños cada 21 días para el control de *Boophilus microplus*.

### Presentaciones

Frasco 1 L, Frasco 250 mL, Frasco 33 mL,

### Vías Administración

Topical Dérmico

### Países

Perú SENASA F.07.08.N.078

### Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES  
QP53 ECTOPARASITICIDAS, INSECTICIDAS Y REPELENTES  
QP53A ECTOPARASITICIDAS PARA USO TOPICAL, INCL. INSECTICIDAS  
QP53AD Amidinas  
QP53AD01 amitraz

### Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios De Uso Externo  
Acaricidas  
Garrapatas  
Piojos

### Web Site

[http://www.corpmontana.com/ganaderia\\_detalle.php?sP=226](http://www.corpmontana.com/ganaderia_detalle.php?sP=226)

Montana

