

**SANITRAZ®** 

Solución Tópica



Composición

Amitraz 12.5 g

### Indicaciones

Para el tratamiento y control de parásitos externos como: Garrapatas: Boophilus microplus (garrapata común del bovino), Boophilus annulatus, Amblyomma cajennense, Amblyomma imitator, Amblyomma maculatum, Dermacentor albipictus, Dermacentor occidentalis, Dermacentor dissimilis, Haemaphysalis spp., Ixodes spp., Otobius megnini. Piojos chupadores: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenoptes capillatus. Piojos masticadores: Damalinea bovis. Acaros de la sarna: Psoroptes bovis, Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei var. bovis, var. aucheniae, var. ovis, Chorioptes bovis, Demodex spp., Psoroptes aucheniae ("caracha", "uma usa"). Asimismo, pueden ser usados para la desinfección de instalaciones.

#### Dosis

Uso externo mediante baños de aspersión. Dosis contra garrapatas en vacunos: Diluir 1.65 ml por cada 1 litro de agua. Usar por lo menos 4 litros de la solución para un animal de aproximadamente 300 kg. Mezclar 1 frasco de Sanitraz de 33ml en la mochila aspersora de 20 litros de agua, cantidad necesaria para bañar 5 animales de 300 kg. Baños cada 21 días para el control de Boophilus microplus.

## **Presentaciones**

Frasco 1 L, Frasco 250 mL, Frasco 33 mL,

# Vias Administración

Topical Dérmico

# **Paises**

Perú SENASA F.07.08.N.078

### Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES QP53 ECTOPARASITICIDAS, INSECTICIDAS Y REPELENTES QP53A ECTOPARASITICDAS PARA USO TOPICAL, INCL. INSECTICIDAS QP53AD Amidinas QP53AD01 amitraz

### Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios De Uso Externo Acaricidas Garrapatas Piojos

## Web Site

http://www.corpmontana.com/ganaderia\_detalle.php?sP=226

Montana

1 MONTANA

