

SULFANOR®

Montana

Polvo Soluble



Composición

Norfloxaciná Nicotinató 4 g
Sulfametoxazol 20 g
Trimetoprim 4 g

Indicaciones

Antibiótico combinado de amplio espectro que contiene Sulfametoxazol al 20%, Norfloxaciná al 4% y Trimetoprim al 4%. Indicado para el tratamiento de enfermedades producidas por bacterias Gram positivo, Gram negativo y Mycoplasma spp. Tiene un alto margen de seguridad. La combinación de antibióticos tiene un efecto sinérgico para controlar las bacterias sensibles.

Dosis

SULFANOR se administra por vía oral en el agua de bebida a razón de 40 mg/ kg de peso vivo al día durante 4 a 7 días en tratamiento tipo pulsos (durante las primeras 4 a 6 horas de consumo de agua). Importante: de acuerdo a la naturaleza del principio activo, SULFANOR debe ser administrado en dosis tipo pulso, durante las primeras 4 a 6 horas del día.
Recomendación: Se recomienda diluir el producto en agua con pH cercano a la neutralidad (pH =7) Periodo de retiro: 10 días.

Presentaciones

Bolsa 25 kg, Bolsa 1 kg,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.03.70.N.1525

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01E SULFONAMIDAS Y TRIMETROPRIM
QJ01EW Combinaciones de sulfonamida y trimetoprim, incl. derivados
QJ01EW11 sulfametoxazol y trimetoprim

Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)
Quinolonas
Sulfonamidas – trimetoprim

Web Site

http://www.corpmontana.com/porcicultura_detalle.php?sP=362