

TRIMAX®

Montana

Emulsión Oral



Composición

Cobalto, sulfato 270 g
Oxfendazol 5 g
Triclabendazol 12 g

Indicaciones

Para el control y tratamiento de la fasciolosis o distomatosis (agudo, sub agudo y crónico), nematodiasis (gastrointestinales, pulmonares) y teniasis del bovino, ovino, caprino y camélidos sudamericanos. Elimina todos los estadios (inmaduros, jóvenes y adultos) de la Fasciola hepática, *Ostertagia* spp., *Cooperia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Haemonchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Bunostomum* spp., *Dictyocaulus viviparus*, *Nematodirus* spp., *Chavertia ovina*, *Lamanema chavezii*, *Graphinema aucheniae*, *Trichuris* spp., *Moniezia* spp., posee un gran poder ovicida y una alta eficacia contra larvas inhibidas (hipobióticas) de *Ostertagia ostertagi*. Además la adición de Cobalto estimula en el animal parasitado la síntesis de vitamina B¹² (antianémica) para una adecuada formación de eritrocitos.

Dosis

Vía oral. 1 ml por cada 10 kg de peso vivo.

Presentaciones

Frasco 1 L, Frasco 250 mL, Frasco 500 mL, Frasco 200 mL, Jeringa 30 mL, Caja 30 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.08.02.N.0533

Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP52 ANTHELMINTICOS
QP52A ANTIHELMINTICOS
QP52AC Benzimidazoles y sustancias relacionadas
QP52AC30 combinaciones de bencimidazoles y sustancias relacionadas

Clases Farmacoterapeutas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Hepáticos (trematodos-fasciola)
Pulmonares – traqueales
Tenias (cestodos)

Web Site

http://www.corpmontana.com/ganaderia_detalle.php?sP=219

MONTANA

