

TRISAN 12%

Suspensión Oral



Composición

Triclabendazol 12 g

Indicaciones

Indicado para el control y tratamiento de la fasciolasis o distomatosis (agudo, sub agudo y crónico) del bovino, ovino, caprinos y camélidos sudamericanos. Elimina todos los estadios (inmaduros, jóvenes y adultos) de la Fasciola hepática.

Dosis

Administración y dosis :Vía oral a una dosis de 10 - 15 mg/kg de triclabendazol o su equivalente a un volumen total de 1 ml por cada 10 kg de peso vivo.

Presentaciones

Cojín 30 mL, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 100 mL, Caja 30 mL,

Vías Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.08.02.N.198

Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP52 ANTHELMINTICOS
QP52A ANTIHELMINTICOS
QP52AC Benzimidazoles y sustancias relacionadas
QP52AC01 triclabendazol

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos
Hepáticos (trematodos-fasciola)

Web Site

http://www.corpmontana.com/ganaderia_detalle.php?sP=220

Montana

 MONTANA

