

## TRISAN 12%

### Suspensión Oral



### Composición

Triclabendazol 12 g

### Indicaciones

Indicado para el control y tratamiento de la fasciolosis o distomatosis (agudo, sub agudo y crónico) del bovino, ovino, caprinos y camélidos sudamericanos. Elimina todos los estadios (inmaduros, jóvenes y adultos) de la Fasciola hepática.

### Dosis

Administración y dosis :Vía oral a una dosis de 10 - 15 mg/kg de triclabendazol o su equivalente a un volumen total de 1 ml por cada 10 kg de peso vivo.

### Presentaciones

Cojín 30 mL, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 100 mL, Caja 30 mL,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.08.02.N.198

### Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES  
QP52 ANTHELMINTICOS  
QP52A ANTIHELMINTICOS  
QP52AC Benzimidazoles y sustancias relacionadas  
QP52AC01 triclabendazol

### Clases Farmacoterapeutas

Antiparasitarios Internos  
Hepáticos (trematodos-fasciola)

### Web Site

[http://www.corpmontana.com/ganaderia\\_detalle.php?sP=220](http://www.corpmontana.com/ganaderia_detalle.php?sP=220)

Montana

MONTANA

