

BOVOMICINA®

Solución Inyectable



Composición

Oxitetraciclina, clorhidrato 5 g

Indicaciones

Tiene acción eficaz contra la mayoría de infecciones bacterianas de los animales. Gram positivos, gram negativos, micoplasma, rickettsias, espiroquetas, clamidias y protozoos. Bovinos: En el tratamiento de Anaplasmosis, Carbunco bacteriano, Carbunco sintomático, Septicemia hemorrágica, Neumoenteritis, mastitis, leptospirosis, metritis, etc. Porcinos: Contra neumonías, septicemia hemorrágica, erisipela, metritis, mastitis, etc. Camélidos, ovinos y caprinos: En la prevención y tratamiento de neumonías, necrobacilosis, mastitis, carbunco sintomáticos. Equinos: En el tratamiento de infecciones respiratorias, septicemia hemorrágica, etc.

Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos a razón de 1 mL/10kg de peso vivo diariamente por período de 3 a 5 días y 1 mL/5kg en caninos y felinos. Uso intrauterino en bovinos de 30 a 50 mL, porcinos, caprinos, ovinos y equinos de 10 a 20 mL. Período de retiro: Leche: 3 a 5 días, Carne: 18 a 21 días.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Intravenoso
Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.03.01.N.0628

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)
Tetracilinas

Web Site

Quimtia

