

BOVOMICINA®

Solución Inyectable



Composición

Oxitetraciclina, clorhidrato 5 g

Indicaciones

Tiene acción eficaz contra la mayoría de infecciones bacterianas de los animales. Gram positivos, gram negativos, micoplasma, rickettsias, espiroquetas, clamidias y protozoos. Bovinos: En el tratamiento de Anaplasmosis, Carbunclo bacteriano, Carbunclo sintomático, Septicemia hemorrágica, Neumoenteritis, mastitis, leptospirosis, metritis, etc.

Porcinos: Contra neumonías, septicemia hemorrágica, erisipela, metritis, mastitis, etc. Camélidos, ovinos y caprinos: En la prevención y tratamiento de neumonías, necrobacilosis, mastitis, carbunclo sintomáticos. Equinos: En el tratamiento de infecciones respiratorios, septicemia hemorrágica, etc.

Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos a razón de 1 mL/10kg de peso vivo diariamente por período de 3 a 5 días y 1 mL/5kg en caninos y felinos. Uso intrauterino en bovinos de 30 a 50 mL, porcinos, caprinos, ovinos y equinos de 10 a 20 mL. Período de retiro: Leche: 3 a 5 días, Carne: 18 a 21 días.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular

Parenteral Intravenoso

Parenteral Subcutáneo

Paises

Perú SENASA F.03.01.N.0628

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeúticas

Antibacterianos (antibioticos)

Tetracilinas

Web Site

Quimtia

