

## BOVOMICINA® SUPER L.A.

Quimtia

### Solución Inyectable



QUIMTIA  
Terapia de veta

### Composición

Oxitetraciclina, clorhidrato 20 g

### Indicaciones

BOVOMICINA SÚPER LARGA ACCIÓN está indicado para todos los gérmenes sensibles a la Oxitetraciclina ya sean bacterias, Mycoplasmas, Ricketsias y algunos protozoos, causantes de enfermedades como: actinobacilosis, anaplasmosis, carbunclo sintomático, coriza infecciosa, diarrea de animales jóvenes, enteritis bacteriana, erisipela porcina, fiebre del transporte, infecciones inespecíficas, infecciones post-parto y post-quirúrgicas, leptospirosis, mastitis septicémica, neumonías y enfermedades respiratorias, querato conjuntivitis y rinitis atrófica, entre otras.



IMAGEN NO  
DISPONIBLE

### Dosis

Bovinos, Camélidos Sudamericanos, Ovinos, Porcinos : 1mL / 10 Kg de peso vivo, correspondiente a 20 mg Kg de p.v.(i.m. profunda). Aves : 0.25 mL / Kg. de peso vivo, correspondiente a 50 mg / Kg. de p.v. (s.c.). Lechones (hasta 2 Kg) : 0.25 mL, correspondiente a 50 mg /animal (s.c.). Lechones (hasta 20 Kg) : 1 mL /animal , correspondiente a 200 mg /animal (s.c.).  
Período de retiro: 28 días.

### Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intramuscular  
Parenteral Subcutáneo

### Paises

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapeúticas

Antibacterianos (antibioticos)  
Tetracilinas

### Web Site

<http://quimtia.perulactea.com/productos/antiboticos/bovomicina-super-larga-accion/>