

CLORTETRASONE NF

Solución Inyectable



Composición

Florfenicol 10 g
Oxitetraciclina, clorhidrato 5 g
Prednisolona 0.5 g

Indicaciones

Infecciones generales y locales, como neumonías, bronconeumonias, diarreas, mastitis, metritis y pedera.

Dosis

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y camélidos 1mL por cada 10 kg de peso vivo. En porcinos perros, gatos, conejos y cuyes 1mL por cada 5 kg de peso vivo. Pollos y gallinas vivianas : De 2 a 4 semanas: 0,25 mL por animal De 4 a 8 semanas: 0,5 mL por animal Más de 8 semanas: 1 mL por animal Gallinas pesadas y gallos: 2 mL por animal Pavos: De 2 a 4 semanas: 0,5 mL por animal De 4 a 6 semanas: 1 mL por animal. De 6 a 9 semanas: 2 mL por animal De 9 a 12 semanas: 3 mL por animal Más de 12 semanas: 4 mL por animal. En todos los casos el tratamiento debe de hacerse de 3 a 5 días seguidos. Período de retiro: Animales de carne: 28 días Aves de carne: 5 días Leche: 5 días

Presentaciones

Frasco 100 mL, Frasco 50 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo
Parenteral Intraarticular o Intrasinovial

Paises

Perú SENASA F.03.01.N.0757

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeúticas

Antibacterianos (antibioticos)
Anfenicos (derivados del cloranfenicol)
Sulfonamidas – trimetoprim
Tetracilinas
Antiinflamatorios
No esteroidales sistémicos

Web Site

Quimtia

