

FASINTEL 10

Suspensión Oral



Composición

Closantel 10 g

Indicaciones

Infestaciones causadas por gusanos redondos gastrointestinales hematófagos, Fasciola hepatica (adultas e inmaduras), Oestrus ovis. Melophagus ovinus, Dermatobia hominis y miasis por Cochliomyia hominivorax.

Dosis

Ovinos y camélidos sudamericanos (Lanares): 1mL/10 kg de peso vivo contra fasciola hepática. 1mL/20 kg de peso vivo contra Oestrus ovis, Melophagus ovinus 1 mL/ 5 kg Cochliomyia y como preventivo contra sarna psoróptica. Bovinos: 1mL/ 10 kg de peso vivo contra fasciola hepatica. Duplicar la dosis para el tratamiento de parasitosis externas. 1mL/ 5 kg de peso vivo contra Cochliomyia y Dermatobia. Periodo de retiro: Carne: 15 días Leche: 5 días.

Presentaciones

Galonera 3.5 L, Frasco 1 mL, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Cojín 30 mL,

Vias Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.09.02.N.028

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos Gastrointestinales (nematodos) Hepáticos (trematodos-fasciola) Antiparasitarios De Uso Externo Acaricidas Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches) Garrapatas Piojos

Web Site

Quimtia



