

FASINTEL PLUS BOVINO

Solución Oral



Composición

Cobalto, sulfato 0.65 g
Levamisol 9 g
Triclabendazol 12 g

Indicaciones

Para el control y tratamiento de infestaciones de tremátodos (Fasciola hepatica, Fasciola gigántica), actuando sobre las formas adultas e inmaduras, incluso las precoces. Simultáneamente actúa sobre de gusanos redondos estomacales (Ostertagia, Trichostróngilus, Cooperia, Lamanema, Nematodirus, Bunostomum, Trichuris, Chabertia, Oesophagostomum) y pulmonares (Dictiocaulus) en sus formas maduras e inmaduras.

Dosis

En bovinos: 1mL de suspensión por 10kg de peso vivo. En conejos y cuyes: Diluir 1 mL con 9 mL de agua, de esta dilución dar 1 mL por cada kg de peso vivo. Periodo de retiro: Carne: 28 días. Leche: 12 días.

Presentaciones

Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Sachet 30 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.08.02.N.0376

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Hepáticos (trematodos-fasciola)
Pulmonares – traqueales

Web Site

Quimtia



IMAGEN NO
DISPONIBLE