

FASINTEL PREMIUM BOVINO

Suspensión Oral



Composición

Cobalto, sulfato 0.65 g
Fenbendazol 7.5 g
Triclabendazol 12 g

Indicaciones

Para el control y tratamiento de infestaciones de tremátodos (Fasciola hepática, Fasciola gigántica), actuando sobre las formas adultas e inmaduras, incluso las precoces. Y simultanea de gusanos estomacales (Ostertagia, Trichostróngilus axei, Haemonchus), intestinales (Trichostóngilus, Cooperia, Nematodirus, Bunostomum, Oesophagostomum) y pulmonares (Dictiocaulus) en sus formas maduras e inmaduras.

Dosis

En bovinos 1mL de suspensión por 10kg de peso vivo Periodo de retiro: Carne: 28 días Leche: 12 días

Presentaciones

Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Sachet 30 mL,

Vías Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.08.02.N.0376

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Hepáticos (trematodos-fasciola)
Pulmonares – traqueales
Tenias (cestodos)

Web Site

Quimtia

