

INNOXITEC

Quimtia

Tableta Oral



Composición

Oxitetraciclina, clorhidrato 0.5 g

Indicaciones

Para la prevención y tratamiento de metritis e infecciones gastrointestinales producidas por bacterias Gram positivo y Gram negativo.

Dosis

Bovinos y equinos: 1 tableta/25 kg p.v. cada 12 horas, equivalente a 20 mg/kg p.v. Uso oral: Terneros y potrillos: Diarreas, neumonías, neumoenteritis, infección del ombligo, abscesos, etc. Dosis preventiva: 1/2- 1 tableta por animal al nacimiento. Dosis curativa: 1/2- 1 tableta por animal durante 2 – 3 días. Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 tableta /25 kg p.v. cada 12 horas por 5 días, equivalente a 20mg/kg p.v. Conejos: 1/2 tableta diluida en 10 ml de agua y administrar 1ml/kg p.v., equivalente a 25 mg/kg p.v. Cuyes: 1 tableta diluida en 10 ml de agua y administrar 1ml/kg p.v., equivalente a 50 mg/kg p.v. Cerdos Diarreas, neumonías, septicemias, etc. Dosis preventiva: Lechones 1/2 tableta, adultos 1 tableta. Dosis curativa: 2 tabletas diarias por 2 a 3 días. Uso intrauterino: Prevención de problemas intrauterinos (metritis, piometra): 1 tableta por animal en el cuerno grávido luego del parto. Tratamiento de problemas intrauterinos: 2-3 tabletas por animal durante 3 a 5 días. Periodo de retiro: Carne: 28 días

Presentaciones

Caja 100 unidad (es),

Vías Administración

Oral
Topical Intrauterina

Países

Perú SENASA F.03.04.N.0865

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)
Tetracilinas

Web Site



IMAGEN NO
DISPONIBLE