

ISPERVIC

Quimtia

Solución Inyectable



Composición

Ivermectina 1 g

Indicaciones

Para el control y tratamiento de los nematodos gastroentericos y pulmonares, adultos e inmaduros, de los generos Ostertagia (incluye L4 inhibida), Trichostrongylus, Dictyocaulus, Cooperia, Oesophagostomum, Nematodirus, Haemonchus, Graphynema, Spiculopteragia, Camelostrongylus, Lamanema, Bunostomum, Ascaris, Hyostrongylus y Metastrongylus. Larvas de insectos: Dermatobia hominis ("nube" y "tupe") e Hypoderma spp. Piojos: Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus, Damalinia aucheniae, Chorioptes bovis. Garrapatas: Boophilus microplus. Acaros de la sarna: Psoroptes bovis, P. ovis y P. aucheniae, Sarcoptes scabiei var.suis.



IMAGEN NO
DISPONIBLE

Dosis

Caprinos, equinos, bovinos y ovinos: 1mL/50kg p.v. Camélidos sudamericanos: 1/1.5 ml/50 kg p.v. Porcinos: 1mL/33kg p.v. Animales menores: 6g/kg p.v. No sacrificar bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos cuya carne se destine al consumo humano hasta pasados 21 días del ultimo tratamiento.

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL,

Vías Administración

Parenteral Subcutáneo

Países

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Pulmonares – traqueales
Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)
Garrapatas
Piojos

Web Site