INADRIM® INYECTABLE

Richmond

Solución Inyectable







Composición

Acepromacina 1 g

Indicaciones

Tranquilizante neuroléptico indicado para sedar animales excitados o agresivos, así como para facilitar el manejo en intervenciones con fines de diagnóstico, terapéutico (tratar heridas, extraer verrugas, quistes y puntos), e intervenciones quirúrgicas menores. Se utiliza particularmente asociado con anestesia local, para castraciones, extirpación de tumores cutáneos, cirugía ocular y volteo de grandes animales. Tranquilizante de uso solo o combinado con anestésicos utilizados para la inducción y mantenimiento, potenciando el efecto de los mismos. Se utiliza frecuentemente como preanestésico 20 minutos antes de la anestesia general.

Dosis

Caninos: Preanestésico: 0,055 a 0,11 mg por kg. Felinos: Preanestésico: 0,055 a 0,11 mg por kg. Equinos: Preanestésico: 2 a 5 mg cada 100 kg. Bovinos:0,01 a 0,1 mg por kg. Ovinos y caprinos: 0,05 a 0,1 mg por kg. Porcinos: Preanestésico: 0,1 a 0,2 mg por kg. Dosis para otras indicaciones: Ver Inserto.

Presentaciones

Frasco 50 mL,

Vias Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Intravenoso
Parenteral Subcutáneo

Paises

Argentina SENASA 00-084

Clase ACTVET

QN SISTEMA NERVIOSO
QN05 PSICOLÉPTICOS
QN05A ANTIPSICÓTICOS
QN05AA Fenotiazinas con cadena lateral alifática
QN05AA04 acepromacina

Clases Farmacoterapeuticas

Drogas Que Actuan Sobre El Sistema Nervioso
Sedantes, preanestesicos y tranquilizantes

Web Site

http://www.richmondvet.com.ar/?seccion=productos&sub=1

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com