

## CEFTOCIDIN® SECADO

Suspensión Intramamaria



### Composición

Cefalexina 100 mg  
Neomicina, sulfato 50 mg  
Penicilina G procaínica 300 mg

### Indicaciones

Está indicado para el secado curativo (mastitis subclínica) o profiláctico de la ubre de las vacas. Se recomienda el uso rutinario de ceftocidin secado en todas las vacas que inician el período de secado. Su beneficio incluye el aspecto profiláctico, ya que evita infecciones durante este lapso y minimiza los riesgos de la próxima lactancia, ejerciendo, además, una muy importante acción curativa de la mastitis subclínica.

### Dosis

Se aplica una jeringa de 5 ml en cada cuarto, masajeando posteriormente el pezón hacia la base para favorecer la dispersión del producto. Se aplica una jeringa de 5 ml en cada cuarto, masajeando posteriormente el pezón hacia la base para favorecer la dispersión del producto.

### Presentaciones

Jeringa 5 mL,

### Vías Administración

Topical Intramamaria

### Países

Perú SENASA F.03.05.I.0560

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)  
Aminoglucosidos  
B-lactámicos  
Cefalosporinas  
Penicilinas

### Web Site

<http://www.tqc.com.pe/veterinaria/antibioticos-/ceftocidin-secado.html>

TQC

