

CEFTOCIDIN® SECADO

Suspensión Intramamaria



Composición

Cefalexina 100 mg
Neomicina, sulfato 50 mg
Penicilina G procaínica 300 mg

Indicaciones

Está indicado para el secado curativo (mastitis subclínica) o profiláctico de la ubre de las vacas. Se recomienda el uso rutinario de ceftocidin secado en todas las vacas que inician el período de secado. Su beneficio incluye el aspecto profiláctico, ya que evita infecciones durante este lapso y minimiza los riesgos de la próxima lactancia, ejerciendo, además, una muy importante acción curativa de la mastitis subclínica.

Dosis

Se aplica una jeringa de 5 ml en cada cuarto, masajeando posteriormente el pezón hacia la base para favorecer la dispersión del producto. Se aplica una jeringa de 5 ml en cada cuarto, masajeando posteriormente el pezón hacia la base para favorecer la dispersión del producto.

Presentaciones

Jeringa 5 mL,

Vías Administración

Topical Intramamaria

Países

Perú SENASA F.03.05.I.0560

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)
Aminoglicosidos
B-lactámicos
Cefalosporinas
Penicilinas

Web Site

<http://www.tqc.com.pe/veterinaria/antibioticos-/ceftocidin-secado.html>

TQC

