DESTROYER TF®

TQC

Suspensión Oral

Composición

Aminoácidos 1.17 g
Cobalto 100 mg
Cobre 50 mg
Fenbendazol 7.5 g
Selenio 20 mg
Triclabendazol 12 g

Indicaciones

Indicado para el tratamiento y control de la fasciolasis o distomatosis (formas agudas, sub-agudas y crónicas) y los nematodos gastrointestinales y pulmonares del ganado vacuno, ovino, caprino y camélidos sudamericanos. Posee gran poder ovicida y es eficaz contra larvas arrestadas o inhibidas (hipobióticas) de Ostertagia spp. resistentes. Los minerales y aminoácidos estimulan la síntesis de vitamina B12, previene anemias, mejora nivel reproductivo y tiene efecto energizante. Puede ser administrado en animales de cualquier edad, hembras gestantes y animales altamente parasitados.

Dosis

Vacunos: 1 ml por cada 10 kg de peso corporal. Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos 1ml/12 Kg de peso corporal.

Presentaciones

Galonera 3500 mL, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL,

Vias Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.0802.N.0564

Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP52 ANTHELMINTICOS
QP52A ANTIHELMÍNTICOS
QP52AC Benzimidazoles y sustancias relacionadas
QP52AC30 combinaciones de bencimidazoles y sustancias relacionadas

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Hepáticos (trematodos-fasciola)
Pulmonares – traqueales
Estimulantes Y Reconstituyentes
Antianemicos y hermatopoyéticos
Reconstituyentes
Minerales (Macroelementos, Microelementos Y Oligoelementos)
Asociados

Web Site

http://www.tqc.com.pe/veterinaria/antiparasitario-interno/destroyer-tf.html

Copyright © 2025 Vademecumveterinario.com