

DIANTIC® MAX®

Suspensión Oral



### Composición

Cobalto 100 mg  
Cobre 50 mg  
Levamisol 1.6 g  
Lisina 0.47 g  
Metionina 0.71 g  
Niclosamida 18 g  
Selenio 20 mg

### Indicaciones

Está indicado para administrarse en bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos, para el tratamiento y control de las teniasis, siendo altamente eficaz contra especies como *Moniezia* spp. y *Thysanosoma* spp. Además, combate nemátodos gastrointestinales y pulmonares adultos como: *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Oesophagostomum* spp., *Bunostomum* spp., *Parafilaria bovicola* (filariasis subcutánea), *Thezalia* spp., *Trichuris* spp. *Lamanema chavezi*, *Graphinema aucheniae*, y *Dyctiocaulus* spp. La combinación con cobalto, cobre, selenio y aminoácidos (metionina y lisina), estimula en el animal parasitado, la síntesis de vitamina B12, esencial para el mantenimiento de las funciones orgánicas, previene anemias, mejora el nivel reproductivo y tiene efecto energizante.

### Dosis

Bovinos 10 ml por cada 20 kg de peso vivo. Ovinos, caprinos y Camélidos Sudamericanos: 5 ml por cada 10 kg de peso vivo. Antes del tratamiento se recomienda mantener en ayunas a los animales, la noche anterior. Período de retiro: Carne: 15 días.

### Presentaciones

Frasco 100 mL, Galonera 3.5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.08.02.N.0814

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos  
Gastrointestinales (nematodos)  
Pulmonares – traqueales  
Tenias (cestodos)  
Minerales (Macroelementos, Microelementos Y Oligoelementos)  
Asociados  
Vitaminas  
Asociadas con aminoácidos

### Web Site

TQC

