

DORAVET® 1%

Solución Inyectable



Composición

Doramectina 10 mg

Indicaciones

Está indicado para el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares) y externas de los bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y porcinos. Es altamente eficaz contra una amplia gama de nematodos y ectoparásitos que afectan la salud y la productividad de las especies domésticas mencionadas.

Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL de DORAVET 1% por cada 50 kg de peso vivo. Porcinos: 1 mL de DORAVET 1% por cada 33 kg de peso vivo. Período de Retiro: Carne: Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 50 días después de finalizado el tratamiento. Leche y huevos: No administrar a vacas, ovejás o cabras cuya leche sea destinada al consumo humano. No administrar a hembras en lactancia, ni 50 días antes del parto

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.08.01.I.0858

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Pulmonares – traqueales
Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuchas)
Reguladores del crecimiento (larvas/huevos)
Garrapatas
Piojos

Web Site

<http://www.tqc.com.pe/veterinaria/endectocida/doravet-1.html>

TQC

