FEBANTEC®10%

TQC

Suspensión Oral



Composición

Aminoácidos 1.17 g
Cobalto 100 mg
Cobre 50 mg
Fenbendazole 10 g
Selenio 20 mg



Indicaciones

Está indicado para el tratamiento y control de los nematodos gastrointestinales, pulmonares y tenias del ganado vacuno, equino, ovino, caprino, camélidos sudamericanos y perros. Posee gran poder ovicida y puede ser administrado en animales de cualquier edad, hembras gestantes y animales altamente parasitados. En rumiantes elimina Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Toxocara vitulorum, Chabertia ovina, Lamanema chavezi, Graphinema aucheniae, Nematodirus lamae, Spiculopteragia peruviana, Trichuris spp., Dictyocaulus spp. Moniezia spp., etc. Asimismo es altamente eficaz contra larvas arrestadas o inhibidas (hipobióticas) de Ostertagia spp. resistentes. En equinos elimina Strongyloides westeri, Strongylus spp., Parascaris equorum, Trichostrongylus axei, Triodontophorus tenuicollis, Oxyuris equi, Anaplocephala spp. En perros elimina Toxocara spp., Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Taenia pisiformis, etc.. Además, la combinación con cobalto, cobre, selenio y aminoácidos estimula en el animal parasitado la síntesis de vitamina B12, esencial para el mantenimiento de las funciones orgánicas. Previene anemias, mejora el nivel reproductivo y tiene efecto energizante.

Dosis

Vacunos, ovinos, caprinos y camélidos: Nematodos gastrointestinales y pulmonares: 1 mL de FEBANTEC 10% por cada 20 kg de peso corporal (equivalente a 5 mg de fenbendazole/kg de p.v.). Larvas inhibidas (Hipobióticas) de Ostertagia spp.: 1,5 mL de FEBANTEC 10% por cada 20 kg de peso corporal (equivalente a 7,5 mg de fenbendazole/kg de p.v.). Tenias: 2 mL de FEBANTEC 10% por cada 20 kg de peso corporal (equivalente a 10 mg de fenbendazole/kg de p.v.). Administrar antes y después de las lluvias. En centros de engorde, administrar antes del inicio del ciclo de engorde. Equinos: 1,5 mL de FEBANTEC 10% por cada 20 kg de peso corporal (equivalente a 7,5 mg de fenbendazole/kg de p.v.). Perros: Administrar 1 ml de FEBANTEC 10% por cada kg de peso corporal (equivalente a 100 mg de fenbendazole/kg de p.v.) en una sola toma. Período de retiro: Carne: 14 días Leche: 3 días

Presentaciones

Galonera 3.5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Sachet 30 mL,

Vias Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F-08-36-N-0658

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com