

FEBANTEC®10%

Suspensión Oral



Composición

Aminoácidos 1.17 g
Cobalto 100 mg
Cobre 50 mg
Fenbendazole 10 g
Selenio 20 mg

Indicaciones

Está indicado para el tratamiento y control de los nematodos gastrointestinales, pulmonares y tenias del ganado vacuno, equino, ovino, caprino, camélidos sudamericanos y perros. Posee gran poder ovicida y puede ser administrado en animales de cualquier edad, hembras gestantes y animales altamente parasitados. En rumiantes elimina *Ostertagia* spp., *Haemonchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Nematodirus* spp., *Cooperia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Bunostomum* spp., *Toxocara vitulorum*, *Chabertia* ovina, *Lamanema chavezii*, *Graphinema aucheniae*, *Nematodirus lamae*, *Spiculopteragia peruviana*, *Trichuris* spp., *Dictyocaulus* spp. *Moniezia* spp., etc. Asimismo es altamente eficaz contra larvas arrestadas o inhibidas (hipobióticas) de *Ostertagia* spp. resistentes. En equinos elimina *Strongyloides westeri*, *Strongylus* spp., *Parascaris equorum*, *Trichostrongylus axei*, *Triodontophorus tenuicollis*, *Oxyuris equi*, *Anaplocephala* spp. En perros elimina *Toxocara* spp., *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Taenia pisiformis*, etc.. Además, la combinación con cobalto, cobre, selenio y aminoácidos estimula en el animal parasitado la síntesis de vitamina B12, esencial para el mantenimiento de las funciones orgánicas. Previene anemias, mejora el nivel reproductivo y tiene efecto energizante.

Dosis

Vacunos, ovinos, caprinos y camélidos: Nematodos gastrointestinales y pulmonares: 1 mL de FEBANTEC 10% por cada 20 kg de peso corporal (equivalente a 5 mg de fenbendazole/kg de p.v.). Larvas inhibidas (Hipobióticas) de *Ostertagia* spp.: 1,5 mL de FEBANTEC 10% por cada 20 kg de peso corporal (equivalente a 7,5 mg de fenbendazole/kg de p.v.). Tenias: 2 mL de FEBANTEC 10% por cada 20 kg de peso corporal (equivalente a 10 mg de fenbendazole/kg de p.v.). Administrar antes y después de las lluvias. En centros de engorde, administrar antes del inicio del ciclo de engorde. Equinos: 1,5 mL de FEBANTEC 10% por cada 20 kg de peso corporal (equivalente a 7,5 mg de fenbendazole/kg de p.v.). Perros: Administrar 1 ml de FEBANTEC 10% por cada kg de peso corporal (equivalente a 100 mg de fenbendazole/kg de p.v.) en una sola toma. Período de retiro: Carne: 14 días Leche: 3 días

Presentaciones

Galonera 3.5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Sachet 30 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Perú: SENASA F-08-26-N-0658

TQC

