

FIRAMITEC®

Solución Inyectable



Composición

Espiramicina 60000000 U.I.

Indicaciones

FIRAMITEC® está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Espiramicina, tales como: neumonías (*Corynebacterium* spp.), mastitis (*Streptococcus* spp.), metritis (*Corynebacterium pyogenes*), artritis (*Mycoplasma hyosynoviae*) en bovinos, porcinos, ovinos, caninos e incluso en aves (*Mycoplasma* spp.). Otras indicaciones a criterio del Médico Veterinario.

Dosis

Bovinos adultos: 1 mL de firamitec® por cada 20 kg de peso vivo. En casos graves repetir la dosis cada 24 ó 36 horas.
Terberos, porcinos, ovinos y caninos: 1 mL de firamitec® por cada 8 kg de peso vivo. En casos graves repetir la dosis cada 24 ó 36 horas.
Aves: Diluir 25 mL de firamitec® hasta 100 mL de agua destilada estéril y aplicar 1 mL de la solución por cada kg de peso vivo. Repetir a los 8 días si fuera necesario.
Período de retiro: Carne: 14 días. Leche: 72 horas (3 días).

Presentaciones

Frasco 100 mL, Frasco 50 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular

Países

Perú SENASA F.03.05.I.0560

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)
Macrólidos

Web Site

<http://www.tqc.com.pe/veterinaria/antibioticos-/firamitec.html>

TQC

