

HEMATEC®

Suspensión Oral



Composición

Biotina 0.1 mg
Cobalto 2 mg
Fósforo 4.5 g
Magnesio 8 mg
Vitamina A 1000000 U.I.
Vitamina B12 1 mg
VITAMINA C 3 g
Vitamina E 600 U.I.

Indicaciones

Para ser utilizado en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, aves y perros por vía oral. Mejora el metabolismo del calcio y fósforo en animales en crecimiento y en casos de hipocalcemia y raquitismo. Estimula el apetito de animales en proceso de engorde. Recupera el apetito de animales que han sufrido alguna enfermedad infecciosa. Incrementa la fertilidad y vitalidad en reproductores. Mejora la cáscara del huevo. Recupera las aves en proceso de muda.

Dosis

Bovinos y equinos adultos 100 – 150 ml/día x 7 días.
Terneros y potrilos 50 ml/día x 7 días. Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos adultos 50 ml/día x 10 días. Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos jóvenes 10 ml/día x 10 días. Marranas en lactación 50 – 100 ml/día x 21 días.
Lechones destetados 10 – 20 ml/día x 10 días Verracos 100 – 150 ml/día x 5 días. Gallinas ponedoras 0.2 – 0.5 ml/día x 5 días. Broilers 0.2 – 0.5 ml/día x 5 días.
Pollos BB 0.1 – 0.2 ml/día x 5 días. Pavos 3 – 5 ml/día x 5 días Patos 0.5 – 2 ml/día x 5 días. Perros mayores de 10 Kg 5 ml/día x 5 días. Perros hasta 10 Kg 3 ml/día x 5 días. Cachorros 1 ml/día x 5 días. No posee período de retiro.

Presentaciones

Bidón 20 L, Galonera 4 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.01.02.N.0364

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Estimulantes Y Reconstituyentes
Estimulantes del apetito
Reconstituyentes
Vitaminas
Asociadas con aminoácidos
Asociadas con minerales

TQC

