

OXYBAC® 20 L.A.

Solución Inyectable



Composición

Oxitetraciclina 20 mL

Indicaciones

Vacunos: Carbunco bacteridiano, carbunco sintomático, septicemia hemorrágica, fiebre de transporte, neumoenteritis, mastitis, leptospirosis, actinomicosis, actinobacilosis, pедера, anaplasmosis, metritis, infecciones neumónicas, bronquitis, pleuritis, pericarditis traumática, infecciones genito urinarias. Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: Neumonías, necrobacilosis, mastitis, artritis infecciosa, carbunco sintomático, aborto enzoótico, leptospirosis, onfalitis, actinobacilosis, diarreas infecciosas, metritis. Porcinos: Neumonías, diarreas infecciosas, leptospirosis, metritis, mastitis, erisipelas, septicemia hemorrágica, síndrome M.M.A., clostridiosis, artritis infecciosa, onfalitis. Conejos: Neumonías, diarreas y en todas infecciones, específicas o no, causadas por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina. Aves: Enfermedad respiratoria crónica, E.R.C. complicada, cólera aviar, coriza infecciosa.

Dosis

Vacunos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y porcinos: 1 ml por cada 10 kg de peso corporal. Conejos: 1ml por cada 2,5 kg de peso corporal. Aves: 0,25 ml por cada kg de peso corporal. Si es necesario, se puede repetir la dosis a las 72 horas. En vacunos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y porcinos, se administra por vía intramuscular profunda. Período de retiro: Carne: Bovinos, ovinos, porcinos y aves: 28 días. Conejos y liebres: 20 días.

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.03.01.I.1456

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)
Tetracilinas

Web Site

<http://www.tqc.com.pe/veterinaria/antibioticos-/oxybac-20-la.html>

TQC

