

## POLIFON®

Polvo Soluble



### Composición

Triclorfon 95 g

### Indicaciones

Es altamente eficaz en el control de piojos, pulgas, dermatobia (tupe o nuche), melófagos (falsa garrapata), ácaros de la sarna y larvas de *Oestrus ovis* (miasis cavitaria). En bovinos controla eficazmente la miasis causada por *Dermatobia hominis* (nuche), mosca de la gusanera (*Cochliomya hominivorax*). Contra parásitos del género *Stephanofilaria*. Como antisárnico actúa contra *Psoroptes bovis* (sarna psoróptica), *Sarcoptes scabiei* var. *bovis* (sarna sarcóptica), *Chorioptes bovis* (sarna coriódica). Piojos chupadores *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus* y el piojo masticador *Damalinea bovis*. En ovinos es muy eficaz contra los ácaros de la sarna *Sarcoptes scabiei* var. *ovis*, *Psoroptes ovis*, *Chorioptes bovis*. Contra el *Melophagus ovinus* (falsa garrapata), larvas de *Oestrus ovis*. Piojos de los géneros *Damalinea* y *Linognathus*. En equinos ejerce acción contra parásitos externos como *Haematopinus asini*, *Habronema* (*Habronemosis* cutánea o llaga de verano). En porcinos es efectivo contra piojos especialmente en *Haematopinus suis* y contra el ácaro *Sarcoptes scabiei* var. *suis*. En caninos actúa eficazmente en parasitosis externas por *Ctenocephalides canis*, *C. felis*, *Sarcoptes scabiei* var. *canis*, *Demodex canis* (alta eficacia mediante aplicación sistémica)

### Dosis

Miasis, gusanera, nuche o tupe: 100 g en 10 L de agua (Inmersión o aspersión). Sarna sarcóptica: 200 g en 10 L de agua (Inmersión o aspersión con repetición a los 12 a 14 días). *Habronemosis* cutánea, tiña y mataduras: 200 g en 2 L de agua (Humedecer la zona afectada tres veces por día). Piojos, pulgas, melófagos en ovinos: 15 g en 10 L de agua (Inmersión o aspersión). Aves: 50 g en 15 L de agua (Inmersión o aspersión). Perros y Conejos: 15 g en 10 L de agua (Inmersión o humedecer la zona afectada). No posee período de retiro. POLIFON es un producto para uso externo, las pequeñas cantidades absorbidas del triclorfón se desdoblán y eliminan en pocas horas. No se acumula en los tejidos musculares o adiposos del organismo. Triclorfón se metaboliza muy rápidamente.

### Presentaciones

Sobre 100 g, Sobre 50 g, Sobre 25 g,

### Vías Administración

Topical Dérmico

### Países

Perú SENASA F.07.04.N.0185

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

TQC

