

POLIFON®

Polvo Soluble



Composición

Triclorfon 95 g

Indicaciones

Es altamente eficaz en el control de piojos, pulgas, dermatobia (tupe o nuche), melófagos (falsa garrapata), ácaros de la sarna y larvas de *Oestrus ovis* (miasis cavitaria). En bovinos controla eficazmente la miasis causada por *Dermatobia hominis* (nuche), mosca de la gusanera (*Cochliomyia hominivorax*). Contra parásitos del género *Stephanofilaria*. Como antisárnico actúa contra *Psoroptes bovis* (sarna psoróptica), *Sarcoptes scabiei* var. *bovis* (sarna sarcóptica), *Chorioptes bovis* (sarna corióptica). Piojos chupadores *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus* y el piojo masticador *Damalinia bovis*. En ovinos es muy eficaz contra los ácaros de la sarna *Sarcoptes scabiei* var *ovis*, *Psoroptes ovis*, *Chorioptes bovis*. Contra el *Melophagus ovinus* (falsa garrapata), larvas de *Oestrus ovis*. Piojos de los géneros *Damalinia* y *Linognathus*. En equinos ejerce acción contra parásitos externos como *Haematopinus asini*, *Habronema* (*Habronemosis cutánea* o llaga de verano). En porcinos es efectivo contra piojos especialmente en *Haematopinus suis* y contra el ácaro *Sarcoptes scabiei* var. *suis*. En caninos actúa eficazmente en parasitosis externas por *Ctenocephalides canis*, *C. felis*, *Sarcoptes scabiei* var. *canis*, *Demodex canis* (alta eficacia mediante aplicación sistémica)

Dosis

Miasis, gusanera, nuche o tupe: 100 g en 10 L de agua (Inmersión o aspersión). Sarna sarcóptica: 200 g en 10 L de agua (Inmersión o aspersión con repetición a los 12 a 14 días). Habronemosis cutánea, tiña y mataduras: 200 g en 2 L de agua (Humedecer la zona afectada tres veces por día). Piojos, pulgas, melófagos en ovinos: 15 g en 10 L de agua (Inmersión o aspersión). Aves: 50 g en 15 L de agua (Inmersión o aspersión). Perros y Conejos: 15 g en 10 L de agua (Inmersión o humedecer la zona afectada). No posee período de retiro. POLIFON es un producto para uso externo, las pequeñas cantidades absorbidas del triclorfón se desdoblan y eliminan en pocas horas. No se acumula en los tejidos musculares o adiposos del organismo. Triclorfón se metaboliza muy rápidamente.

Presentaciones

Sobre 100 g, Sobre 50 g, Sobre 25 g,

Vías Administración

Topical Dérmico

Paises

Perú SENASA F.07.04.N.0185

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

TQC

