

## RANIDE® FORTE

### Suspensión Oral



### Composición

Albendazol 9 g  
Cobalto 100 mg  
Lisina 0.47 g  
Metionina 0.7 g  
Rafoxanide 10 g

### Indicaciones

Está indicado para el control y tratamiento de las formas adultas y juveniles de *Fasciola hepatica*, nematodos gastrointestinales: *Ostertagia* sp. (incluidas las larvas inhibidas o hipobióticas), *Haemonchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Nematodirus* spp., *Cooperia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Bunostomum* spp., *Chavertia ovina*, *Lamanema chavezii*, *Graphinema aucheniae*, *Trichuris* spp., nemátodos pulmonares, *Dyctiocaulus* spp., tenias: *Moniezia* spp., larvas de *Oestrus ovis* (gusano de la nariz). La combinación con cobalto y aminoácidos estimula la síntesis de B12, mantiene las funciones orgánicas, previene anemias y mejora el nivel reproductivo. Tiene efecto energizante y estimula el apetito en el animal parasitado.

### Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1ml por cada 10 kg de peso vivo (10,0 mg/kg de Rafoxanide y 9,0 mg/kg de Albendazole). Administrar antes y después de las lluvias (como mínimo). En ganado de engorde administrar antes del inicio de ciclo de engorde. Período de retiro: Carne 28 días. No administrar en animales en producción de leche para consumo humano. Trátese durante el período seco.

### Presentaciones

Galonera 3.5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Sachet 40 mL,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.08.02.N.0783

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos  
Gastrointestinales (nematodos)  
Hepáticos (trematodos-fasciola)  
Tenias (cestodos)  
Minerales (Macroelementos, Microelementos Y Oligoelementos)  
Asociados

### Web Site

<http://www.tqc.com.pe/veterinaria/antiparasitario-interno/ranide-forte.html>

## TQC

