

SARNAVET®

Solución Inyectable



Composición

Ivermectina 1 g

Indicaciones

Está indicado para el tratamiento y control de nemátodos gastrointestinales, pulmonares y ectoparásitos en bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos y porcinos. Está indicado para el tratamiento y control de nemátodos gastrointestinales, pulmonares y ectoparásitos en bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos y porcinos. Es altamente eficaz contra: Bovinos: Nemátodes gastrointestinales: Haemonchus placei, Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctata, Oesophagostomun radiatum, Nematodirus helvetianus, N spathiger, Strongyloides papillosus, Bunostomum phlebotomum, Toxocara vitulorum. Nemátodes pulmonares: Dictyocaulus viviparus, Dictyocaulus filaria Piojos: Lynognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenoptes capillatus, Damalinea bovis. Ácaros: Psoroptes ovis var. bovis, Sarcoptes scabiei, Chorioptes bovis. Garrapata: Boophilus microplus, Ornithodorus savigny. Ovinos y Camélidos Sudamericanos: Nemátodes gastrointestinales: Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta, O. trifurcata, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, T. vitrinus, Nematodirus fillicolis, N. spathiger, N. lamae, Cooperia curticei, Oesophagostomun columbianum, O. venulosum, Chabertia ovina, Trichuris ovis, Strongyloides papillosus, entre otros.

Dosis

Bovinos, ovinos y camélidos sudamericanos: 1 ml por cada 50 kg de peso vivo. Porcinos: 1 ml por cada 33 kg de peso vivo, vía subcutánea en el cuello. Rumiantes: Nematodos gastrointestinales: Administrar antes y después de las lluvias. Sarna: Administrar de acuerdo a la incidencia de la enfermedad. Cerdos: Administrar de acuerdo a la incidencia de endo y ecto parásitos. Período de retiro: Los animales no deben ser sacrificados antes de los 42 días

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL,

Vias Administración

Parenteral Intramuscular Parenteral Subcutáneo

Paises

Perú SENASA F.09.01.I.0202

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos Gastrointestinales (nematodos) Pulmonares – traqueales Antiparasitarios De Uso Externo **TQC**



