

SUPER PRO®

Solución Inyectable



Composición

Alanina (L-Alanina) 100 mg
Arginina, clorhidrato 200 mg
Aspártico, ácido 200 mg
Cianocobalamina (Vitamina B12) 5000 mcg
Cisteína (L-Cisteína clorhidrato) 50 mg
Cobalto, sulfato 13 mg
Cobre, sulfato 2 mg
Fenilalanina (L-Fenilalanina) 50 mg
Glicina 420 mg
Glutamato, monosódico 420 mg
HIPOFOSFITO DE CALCIO 1500 mg
Histidina, clorhidrato 210 mg
Isoleucina (L-Isoleucina) 50 mg
Leucina (L-Leucina) 210 mg
Lisina (L-Lisina HCl) 1000 mg
Magnesio, cloruro 210 mg
Metionina (DL-Metionina) 210 mg
Nicotinamida 150 mg
Piridoxina, clorhidrato 10 mg
Potasio, yoduro 15 mg
Prolina 100 mg
Riboflavina fosfato sódico 5 mg
Serina 100 mg
Sodio, cloruro 50 mg
Tiamina (Vitamina B1) 10 mg
Tirosina (L-Tirosina) 30 mg
Treonina (L-Treonina) 200 mg
Triptofano (L-Triptófano) 50 mg
Valina (L-Valina) 200 mg
Vitamina A palmitato 1200000 U.I.
VITAMINA D3 2000000 U.I.
Vitamina E 100 U.I.
Zinc, cloruro 10 mg

Indicaciones

SUPERPRO® está indicado como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias o de origen orgánico (metabólicas), así como para procesos de convalecencia de enfermedades. Además, es útil en el tratamiento de las deficiencias de vitaminas, minerales y aminoácidos en su composición.

Dosis

Bovinos: 1 ml de SUPERPRO® por cada 50 kg de peso vivo.
Porcinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 ml de SUPERPRO® por cada 20 kg de peso vivo. Las dosis pueden ser repetidas cada 90 días o a criterio del Médico Veterinario No posee periodo de retiro.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL,

Vías Administración

Parenteral Subcutáneo

Países

TQC

