

## SUPER PRO®

Solución Inyectable



### Composición

Alanina (L-Alanina) 100 mg  
Arginina, clorhidrato 200 mg  
Aspártico, ácido 200 mg  
Cianocobalamina (Vitamina B12) 5000 mcg  
Cisteína (L-Cisteína clorhidrato) 50 mg  
Cobalto, sulfato 13 mg  
Cobre, sulfato 2 mg  
Fenilalanina (L-Fenilalanina) 50 mg  
Glicina 420 mg  
Glutamato, monosódico 420 mg  
HIPOFOSFITO DE CALCIO 1500 mg  
Histidina, clorhidrato 210 mg  
Isoleucina (L-Isoleucina) 50 mg  
Leucina (L-Leucina) 210 mg  
Lisina (L-Lisina HCl) 1000 mg  
Magnesio, cloruro 210 mg  
Metionina (DL-Metionina) 210 mg  
Nicotinamida 150 mg  
Piridoxina, clorhidrato 10 mg  
Potasio, yoduro 15 mg  
Prolina 100 mg  
Riboflavina fosfato sódico 5 mg  
Serina 100 mg  
Sodio, cloruro 50 mg  
Tiamina (Vitamina B1) 10 mg  
Tirosina (L-Tirosina) 30 mg  
Treonina (L-Treonina) 200 mg  
Triptofano (L-Triptófano) 50 mg  
Valina (L-Valina) 200 mg  
Vitamina A palmitato 1200000 U.I.  
VITAMINA D3 2000000 U.I.  
Vitamina E 100 U.I.  
Zinc, cloruro 10 mg

### Indicaciones

SUPERPRO® está indicado como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias o de origen orgánico (metabólicas), así como para procesos de convalecencia de enfermedades. Además, es útil en el tratamiento de las deficiencias de vitaminas, minerales y aminoácidos en su composición.

### Dosis

Bovinos: 1 ml de SUPERPRO® por cada 50 kg de peso vivo.  
Porcinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 ml de SUPERPRO® por cada 20 kg de peso vivo. Las dosis pueden ser repetidas cada 90 días o a criterio del Médico Veterinario No posee periodo de retiro.

### Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL,

### Vías Administración

Parenteral Subcutáneo

### Países

TQC

