

ADRENA-VIDA

Solución Inyectable



Composición

Adrenalina (bitartrato) 100 mg

Indicaciones

Tratamiento de reacciones de hipersensibilidad tipo I (shock anafiláctico). En heridas abiertas o abrasiones de la piel puede aplicarse directamente para inducir hemostasia. En intervenciones quirúrgicas muy sangrantes como vasoconstrictor periférico.

Dosis

Equinos y vacunos: 4-8 mL/animal; terneros, ovinos, porcinos y caprinos: 1-3 mL/animal; caninos y felinos: 0.1-0.5 mL/animal. Aplicación vía subcutánea, intramuscular o intravenosa.

Presentaciones

Frasco 50 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Intravenoso
Parenteral Subcutáneo

Países

Costa Rica SENASA MAG PE10-50-02-4182
Guatemala MAGA PE247-60-354-1842
Panamá MIDA RF-3708-06
Perú SENASA F.05.01.N.0009

Clase ACTVET

QC SISTEMA CARDIOVASCULAR
QC01 TERAPIA CARDIACA
QC01C ESTIMULANTES CARDIACOS EXCL. GLICOSIDOS CARDIACOS
QC01CA Agentes adrenergicos y dopaminergicos
QC01CA24 epinefrina

Clases Farmacoterapeuticas

Estimulantes Y Reconstituyentes
Cardiacos – circulatorios

Web Site

<http://agrovvetmarket.com/productos-veterinarios/adrena-vida-adrenalina-vasoconstrictor-shock-anafilactico>

Agrovvet Market Animal Health

