ANTIPIROZENE B12

Agrovet Market Animal Health

Otros



Composición

Antipirina 2.36 g
Diminaceno, aceturato 1.05 g
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 3 mg



Indicaciones

Antiprotozoario. Profilaxis y tratamiento de la babesia/piroplasmosis y tripanosomiasis. En el tratamiento del papillomatosis de los bóvinos, inhibiendo el desarrollo del virus. En gatos se encuentra indicado en casos de cystauzoonosis. La antipirina, incluido en el excipiente, asegura una solubilidad completa del ingrediente activo y actúa como una ayuda a luchar contra la inflamación y la fiebre. La Vitamina B12 ayuda en la prevención de agranulositosis y leucopenia, contribuye a la maduración de eritrocitos en la médula ósea.

Dosis

En general 3.5 mg/kg p.v. Para obtener dicha concentración, disolver el contenido total (2.36 g) en 15 mL de agua estéril. Inyectar 1 mL/20 kg de p.v. (solución ya reconstituida). En caninos, añadir 25 mL de agua estéril a cada sachet de 2.36 g; inyectar 1 mL/10 kg (solución ya reconstituida). Intervalos cada 24 horas o a criterio del criterio del Médico Veterinario. Caninos: Babesia: repetir a las 25 horas; tripanosomiasis: repetir cada dos semanas hasta la remisión clínica reportada por el laboratorio. Bovinos, ovinos, caprinos y equinos: Una sola vez y no exceder los 4 g totales por animal. Si se requiere repetir la dosis se realiza a criterio del médico veterinario a las 24 horas. Equinos: Dividir la dosis total y aplicarla intervalos de 1 a 2 horas. Aplicar vía intramuscular.

Presentaciones

Sobre 23 g, Sachet 2 g,

Vias Administración

Parenteral Intramuscular

Paises

Perú SENASA

Clase ACTVET

QP PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES
QP51 ANTIPROTOZOALES
QP51A AGENTES CONTRA ENFERMEDADES DE PROTOZOARIOS
QP51AF Diamidinas aromáticas
QP51AF01 diminazen

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos
Antiprotozoarios
Anaplasma y coadyuvantes
Babesia
Tripanosoma

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com