

CEFA-MILK®

Suspensión Intramamaria



Composición

Cefalexina, monohidrato 200 mg

Indicaciones

Indicado para el tratamiento de mastitis en bovinos, ovinos y caprinos en producción láctea, causadas por gérmenes sensibles a la cefalexina. Debe ser usado a los primeros signos de inflamación o a la primera indicación de cualquier alteración en la leche. El exclusivo sistema Duo Cap®, ofrece la posibilidad de realizar una aplicación profunda o una administración cercana al esfínter del pezón.

Dosis

Vacunos: 1 jeringa/cuarto afectado cada 12 a 24 horas durante 2 días o hasta la recuperación completa. Ovinos y caprinos: 1/2 jeringa/cuarto afectado cada 12 a 24 horas durante 2 días o hasta la recuperación completa. Aplicar vía intramamaria.

Presentaciones

Envase de plastico 48 unidad (es),

Vías Administración

Topical Intramamaria

Paises

Costa Rica SENASA MAG PE10-8-01-2858

Ecuador AGROCALIDAD 2C1-8418

Guatemala MAGA PE241-08-01-1859

Panamá MIDA RF-2832-04

Perú SENASA F.03.05.N.0596

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO

QJ51 ANTIBACTERIANOS PARA USO INTRAMAMARIO

QJ51D OTROS ANTIBACTERIANOS BETA-LACTAMICOS PARA USO INTRAMAMARIO

QJ51DB Cefalosporinas de primera generación

QJ51DB01 cefalexina

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)

B-lactamicos

Cefalosporinas

Antibioticos de uso especifico solo a asociados

Antimastiticos específicos intramamarios

Web Site

<http://agrovetmarket.com/productos-veterinarios/cefa-milk-cefalexina-antibiotico-vacas-lactacion>

Agrovet Market Animal Health

