

## CEFA-SEC®

### Suspensión Intramamaria



### Composición

Cefalexina, monohidrato 200 mg  
Neomicina, sulfato 340 mg  
Vitamina A (retinol acetato) 10000 mg

### Indicaciones

Indicado para el tratamiento de infecciones subclínicas y en la prevención rutinaria de las mastitis en bovinos al inicio del período de secado, causadas por gérmenes que son sensibles a cualquier antibiótico de la fórmula. Posee triple acción: inmediata, hasta la 4° y hasta la 6° semana posterior a su aplicación. Está adicionado con vitamina A como regenerador epitelial de la glándula mamaria. El exclusivo sistema Duo Cap®, ofrece la posibilidad de realizar una aplicación profunda o una administración cercana al esfínter del pezón.

### Dosis

Vacunos: 1 jeringa/cuarto al final del último ordeño del período de lactación. Aplicar mediante infusión intramamaria.

### Presentaciones

Envase de plástico 48 unidad (es),

### Vías Administración

Topical Intramamaria

### Paises

Costa Rica SENASA MAG PE10-08-01-2931

Ecuador AGROCALIDAD 2C1-8420

El Salvador MAG VE2011114339

Guatemala MAGA PE241-07-03-1217

Honduras SAG PF-5095

México SAGARPA Q-0616-025

Panamá MIDA RF-2835-14

Paraguay SENACSA 11.932

Perú SENASA F.03.05.N.0620

República Dominicana MAG 6239

Venezuela SAG MAT-SASA-M.I 10.938

### Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO

QJ51 ANTIBACTERIANOS PARA USO INTRAMAMARIO

QJ51C BETA-LACTAMICOS ANTIBACTERIANOS, PENICILINAS, PARA USO INTRAMAMARIO

QJ51CR Combinaciones de penicilinas y / o inhibidores de beta-lactamasas

QJ51CR50 combinaciones de penicilinas

### Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)

Aminoglucosidos

B-lactamicos

Cefalosporinas

Penicilinas

Antibióticos de uso específico solo a asociados

Antimastíticos específicos intramamarios

## Agrovet Market Animal Health

