CEFA-SEC®

Agrovet Market Animal Health

Suspensión Intramamaria

Composición

Cefalexina, monohidrato 200 mg
Neomicina, sulfato 340 mg
Vitamina A (retinol acetato) 10000 mg



Indicaciones

Indicado para el tratamiento de infecciones subclínicas y en la prevención rutinaria de las mastitis en bovinos al inicio del período de secado, causadas por gérmenes que son sensibles a cualquier antibiótico de la fórmula. Posee triple acción: inmediata, hasta la 4° y hasta la 6° semana posterior a su aplicación. Está adicionado con vitamina A como regenerador epitelial de la glándula mamaria. El exclusivo sistema Duo Cap®, ofrece la posibilidad de realizar una aplicación profunda o una administración cercana al esfínter del pezón.

Dosis

Vacunos: 1 jeringa/cuarto al final del último ordeño del periodo de lactación. Aplicar mediante infusión intramamaria.

Presentaciones

Envase de plastico 48 unidad (es),

Vias Administración

Topical Intramamaria

Paises

Costa Rica SENASA MAG PE10-08-01-2931
Ecuador AGROCALIDAD 2C1-8420
El Salvador MAG VE2011114339
Guatemala MAGA PE241-07-03-1217
Honduras SAG PF-5095
México SAGARPA Q-0616-025
Panamá MIDA RF-2835-14
Paraguay SENACSA 11.932
Perú SENASA F.03.05.N.0620
República Dominicana MAG 6239
Venezuela SAG MAT-SASA-M.I 10.938

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ51 ANTIBACTERIANOS PARA USO INTRAMAMARIO
QJ51C BETA-LACTAMICOS ANTIBACTERIANOS, PENICILINAS, PARA USO INTRAMAMARIO
QJ51CR Combinaciones de penicilinas y / o inhibidores de beta-lactamasas
QJ51CR50 combinaciones de penicilinas

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Aminoglucosidos
B-lactamicos
Cefalosporinas
Penicilinas
Antibióticos de uso especifico solo a asociados
Antimastiticos específicos intramamarios

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com