

CEFAJECT

Suspensión Inyectable



Composición

Ceftiofur, clorhidrato 5 g

Indicaciones

Antibiótico betalactámico cefalosporínico de tercera generación, con un amplio espectro; es activo frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluyendo cepas bacterianas que producen beta-lactamasa (penicilinasa). Indicado en todos los procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles al ceftiofur (como clorhidrato)

Dosis

Vacunos: 1-2.2 mL/50 kg de p.v. Porcinos: 0.6-1 mL/10 kg de p.v. Ovinos, caprinos y camélidos: 0.22-0.44 mL/10 kg de p.v. El tratamiento debe repetirse a intervalos de 24 horas por 3 días consecutivos (hasta 5 días en el caso de metritis). Administrar vía intramuscular profunda.

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular

Países

Bolivia SENASAG 006007
Panamá MIDA RF-6849-14
Perú SENASA F.03.42.I.1671

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01D OTROS ANTIBACTERIANOS BETA-LACTAMICOS
QJ01DD Cefalosporinas de tercera generación
QJ01DD90 ceftiofur

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibióticos)
B-lactámicos
Cefalosporinas

Web Site

<http://agrovvetmarket.com/productos-veterinarios/cefaject-ceftiofur-antibiotico-cefalosporina-cero-residuos>

Agrovvet Market Animal Health

