

## COLISTIX® C100 PX

### Premix



### Composición

Colistina, sulfato 10 g

### Indicaciones

Tratamiento y prevención de las enfermedades entéricas causadas por microorganismos sensibles y como promotor de crecimiento. Pollos, ponedoras, gallos y pavos: Tifosis, pulorosis, colibacilosis, infecciones secundarias. Cerdos: enterotoxemia, colibacilosis entérica, salmonelosis, diarreas de diversa etiología, infecciones secundarias. Terneros, corderos, cabritos, tuis (camélidos): infecciones digestivas, salmonelosis, diarreas infecciosas, enterotoxemia.

### Dosis

Aves: 75,000 -100,000 UI/kg peso vivo/día (hasta 125,000 en casos muy graves), en la práctica: Promotor: 100-150 g/TM alimento, continuo. Preventivo: 150-300 g/TM alimento durante el período de riesgo. Terapéutico: 400-600 g/TM alimento por 5-7 días. Cerdos: 100,000 UI/kg peso vivo/día, en la práctica: Promotor: 200-300 g/TM alimento, continuo. Preventivo: 400-600 g/TM alimento durante el período de riesgo. Terapéutico: 600-1,000 g/TM alimento por 5-7 días. Terneros, tuis, corderos y cabritos: 100,000 UI/kg peso vivo/día, en la práctica: Preventivo: 400-600 g/TM alimento durante el período de riesgo. Terapéutico: 600-1,000 g/TM alimento por 5-7 días. Dosis individual: 2 veces/día: 1 g/50 Kg/vez por 7 días.

### Presentaciones

Caja 20 kg, Pote 1 kg, Pote 100 g, Sobre 15 g,

### Vías Administración

Oral

### Paises

Perú SENASA

### Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO  
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO  
QJ01X OTROS ANTIBACTERIANOS  
QJ01XB Polimixinas  
QJ01XB01 colistina

### Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)  
Otros antibióticos

### Web Site

## Agrovet Market Animal Health

