

COLISTIX® C100 PX

Premix



Composición

Colistina, sulfato 10 g

Indicaciones

Tratamiento y prevención de las enfermedades entéricas causadas por microorganismos sensibles y como promotor de crecimiento. Pollos, ponedoras, gallos y pavos: Tifosis, pulorosis, colibacilosis, infecciones secundarias. Cerdos: enterotoxemia, colibacilosis entérica, salmonelosis, diarreas de diversa etiología, infecciones secundarias. Terneros, corderos, cabritos, tuis (camélidos): infecciones digestivas, salmonelosis, diarreas infecciosas, enterotoxemia.

Dosis

Aves: 75,000 -100,000 UI/kg peso vivo/día (hasta 125,000 en casos muy graves), en la práctica: Promotor: 100-150 g/TM alimento, continuo. Preventivo: 150-300 g/TM alimento durante el período de riesgo. Terapéutico: 400-600 g/TM alimento por 5-7 días. Cerdos: 100,000 UI/kg peso vivo/día, en la práctica: Promotor: 200-300 g/TM alimento, continuo. Preventivo: 400-600 g/TM alimento durante el período de riesgo. Terapéutico: 600-1,000 g/TM alimento por 5-7 días. Terneros, tuis, corderos y cabritos: 100,000 UI/kg peso vivo/día, en la práctica: Preventivo: 400-600 g/TM alimento durante el período de riesgo. Terapéutico: 600-1,000 g/TM alimento por 5-7 días. Dosis individual: 2 veces/día: 1 g/50 Kg/vez por 7 días.

Presentaciones

Caja 20 kg, Pote 1 kg, Pote 100 g, Sobre 15 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01X OTROS ANTIBACTERIANOS
QJ01XB Polimixinas
QJ01XB01 colistina

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibióticos)
Otros antibióticos

Web Site

Agrovvet Market Animal Health

