

## COLISTIX® WS

Polvo Soluble



### Composición

Colistina, sulfato 10 g

### Indicaciones

Tratamiento y prevención de las enfermedades entéricas causadas por microorganismos sensibles y como promotor de crecimiento. Aves: Tifosis, pulorosis, colibacilosis. Cerdos: enterotoxemia, colibacilosis entérica, salmonelosis, diarreas de diversa etiología, infecciones bacterianas secundarias. Terneros, corderos, cabritos, tuis (camélidos): infecciones digestivas, salmonelosis, diarreas infecciosas, enterotoxemia.

### Dosis

Aves: Preventivo y como promotor: 100-200 g/1,000 L agua (o en 750 kg de alimento) Terapéutico: 300 -400 g/1,000 L agua (o en 750 kg de alimento) por 5-7 días. Cerdos: Preventivo y como promotor: 200-300 g/1,000 L agua (o en 500 kg de alimento). Terapéutico: 300 -500 g/1,000 L agua (o en 500 kg de alimento) por 5-7 días. Terneros, tuis, corderos y cabritos: 2 veces al día, 1 g/50 Kg por 5-7 días (en agua, leche o alimento).

### Presentaciones

Envase 20 kg, Pote 1 kg, Pote 100 g, Sobre 15 g,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA

### Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO  
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO  
QJ01X OTROS ANTIBACTERIANOS  
QJ01XB Polimixinas  
QJ01XB01 colistina

### Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibióticos)  
Otros antibióticos

### Web Site

Agrovet Market Animal Health

