

COLISTIX® WS

Polvo Soluble



Composición

Colistina, sulfato 10 g

Indicaciones

Tratamiento y prevención de las enfermedades entéricas causadas por microorganismos sensibles y como promotor de crecimiento. Aves: Tifosis, pulorosis, colibacilosis. Cerdos: enterotoxemia, colibacilosis entérica, salmonelosis, diarreas de diversa etiología, infecciones bacterianas secundarias. Terneros, corderos, cabritos, tuis (camélidos): infecciones digestivas, salmonelosis, diarreas infecciosas, enterotoxemia.

Dosis

Aves: Preventivo y como promotor: 100-200 g/1,000 L agua (o en 750 kg de alimento) Terapéutico: 300 -400 g/1,000 L agua (o en 750 kg de alimento) por 5-7 días. Cerdos: Preventivo y como promotor: 200-300 g/1,000 L agua (o en 500 kg de alimento). Terapéutico: 300 -500 g/1,000 L agua (o en 500 kg de alimento) por 5-7 días. Terneros, tuis, corderos y cabritos: 2 veces al día, 1 g/50 Kg por 5-7 días (en agua, leche o alimento).

Presentaciones

Envase 20 kg, Pote 1 kg, Pote 100 g, Sobre 15 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01X OTROS ANTIBACTERIANOS
QJ01XB Polimixinas
QJ01XB01 colistina

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibióticos)
Otros antibióticos

Web Site

Agrovet Market Animal Health

