

HIDROLYTE® WS

Polvo Soluble



Composición

citrato, trisódico dihidrato 200 mg

Cítrico, ácido 5 g

Cobre AHM 500 mg

Dextrosa monohidratado 56 mg

Glicina 8 g

Hierro AHM 334 mg

Magnesio, sulfato 800 mg

Manganoso AHM 1576 mg

Potasio, cloruro 4 g

Probióticos 3 mg

Sodio, cloruro 11 g

Sodio, fosfato 5 g

Zinc AHM 431 mg

Indicaciones

Tratamiento y prevención de los cuadros de deshidratación, desequilibrio electrolítico y carencia energética a causa de pérdidas excesivas por diarrea, vómitos, sudoración, enfermedades, temperaturas altas, respiración u orina en exceso. Como preventivo y soporte de diarreas. Convalecencia, post – vacunaciones, despique y recepción de aves, estrés de transporte, stress calórico, acidosis.

Dosis

Aves: 1 Kg / 1000 L de agua. Porcinos: 1 kg/750 L de agua.

Terneros lactantes y potros: Individual: 0.5 g/kg p.v. a razón de 30-40 g/L de agua. Terneros engorde: 1 kg/500 L de agua ad libitum. Corderos, cabritos y tuis: Individual: 10 g por toma con agua. En grupo: 150 g/10 L de agua ad libitum. Bovinos, equinos, conejos y animales menores: Individual de acuerdo al peso a razón de 40 g/ L de agua de bebida.

Presentaciones

Pote 1 kg, Sobre 100 g, Sobre 15 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA

Clase ACTVET

QA TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO

QA07 AGENTES

QA07C ELECTROLITOS CON CARBOHIDRATOS

QA07CQ Formulaciones de rehidratación Oral para uso veterinario

QA07CQ02 electrolitos orales y carbohidratos

Clases Farmacoterapéuticas

Minerales (Macroelementos, Microelementos Y Oligoelementos)

Asociados

Probióticos y prebióticos

Web Site

Agrovet Market Animal Health

